

Salut SEXUAL

Servei de promoció de salut sexual

Què són les ITS?

Són infeccions que es transmeten principalment a través del contacte sexual, sigui vaginal, anal o oral. Poden ser causades per bacteris, virus, paràsits o fongs, i algunes poden ser asimptomàtiques, fet que fa que moltes persones no sàpiguin que estan infectades.

És important destacar que moltes ITS poden ser asimptomàtiques, per això es recomana fer revisions periòdiques i utilitzar mètodes de protecció com el preservatiu per prevenir el contagi.

Què trobaràs al nostre servei?

- Dispensació de preservatius i lubricants.
- Assessorament i acompanyament entorn les sexualitats.
- Prova ràpida del VIH i la sífilis.

GRATUÏT I CONFIDENCIAL

ON MÉS ENS
POTS TROBAR?



DÍACRÍ TÍQUÈS

antisida
Lleida



Contacta

Carrer Nou, 14 Lleida

973 26 11 11

629 906 324

consulta@antisidalleida.org

www.somdiacritiques.com

@somdiacritiques

Informació ITS

INFECCIONS DE
TRANSMISSIÓ SEXUAL

DÍACRÍ TÍQUÈS

antisida
Lleida

Sífilis

SIMPTOMATOLOGIA

- **Eta**pa inicial: Apareixen al cap d'unes 3 setmanes. Úlceres petites, no doloroses (xancres) a la zona d'infecció (normalment a genitals, anus o boca).
- **Eta**pa secundària: Apareix al cap de 4 o 6 setmanes. Erupcions cutànies a plantes dels peus o als palmells de les mans o a altres parts del cos, febre, mal de gola.
- **Eta**pa terciària: Apareix després de les 6 setmanes. Complicacions greus (neurològiques, cardiovasculars).

DETECCIÓ

- Frotis vaginal, anal o faringi o mostra d'orina.
- Anàlisi de sang i proves ràpides d'anticossos.

TRACTAMENT

- Penicil·lina.

Gonorrea

SIMPTOMATOLOGIA

- Apareixen a partir del 2n o 7è dia i poden ser:
- **Penis/Vulva:** Secrecions groguenques o verdoses, dolor a l'orinar.
 - **Anus:** Dolor, picor, secrecions o sangrat.
 - **Boca:** Mal de gola o sensació de dolor.

DETECCIÓ

- Frotis vaginal, anal o faringi o mostra d'orina.
- Proves ràpides d'antígens.

TRACTAMENT

- Penicil·lina.

Clamídia

SIMPTOMATOLOGIA

- Apareixen entre 7 i 21 dies i poden ser:
- **Penis/Vulva:** Secrecions anormals (clara o blanquinosa), Sensació de cremor en orinar.
 - **Anus:** dolor rectal, secreció anormal de l'anús i petites hemorràgies rectals.
 - **Boca:** Rarament presenta símptomes, però pot causar mal de gola.

DETECCIÓ

- Frotis vaginal, anal o faringi o mostra d'orina.
- Proves ràpides d'antígens (a partir de la setmana 6).

TRACTAMENT

- Penicil·lina.

Virus del Papil·loma Humà (VPH)

SIMPTOMATOLOGIA

- Només en el cas de les berrugues genitals o condilomes, causades per tipus del VPH de baix risc oncogènic, podem observar símptomes.
- Les persones amb una infecció pel VPH no sempre tenen cap símptoma o perquè presenten lesions difícils de veure a simple vista.

DETECCIÓ

- Reconeixement mèdic per a berrugues.
- Citologia o proves de detecció de lesions precanceroses (especialment en dones, a través de la prova de Papanicolaou o test d'HPV).

TRACTAMENT

- La majoria dels casos cura sol. Es poden tractar les berrugues o lesions precanceroses.

ITS	CURACIÓ? TRACTAMENT	TRANSMISSIÓ SEXUAL	PRÀCTIQUES SEXUALS de més risc*
SÍFILIS	SÍ. ANTIBIÒTIC	Xancres o pell/mucoses infectades	P/SO/PN/J/S
GONORREA	SÍ. ANTIBIÒTIC	Secrecions del penis, vagina anus o gola	P/SO/PN/J/S
CLAMIDIES	SÍ. ANTIBIÒTIC	Secrecions del penis, vagina o anus	PN/J/S
HEPATITIS C	Sí en infecció aguda VARIABLE en infecció crònica	Sang	P/J/S
VPH	Desaparició o latència intermitent Només símptomes	Pell/mucosa infectada i berrugues	P/SO/PN
VIRUS HERPES SIMPLE (VHS)	NO > latent intermitent Només símptomes	Lesions i pell/mucoses infectades. Secrecions de l'anús, penis i vagina	P/SO
Pràctiques sexuals*: penetració anal/vaginal (P) sexe oral (SO) petó negre (PN) intercanvi de joguines sexuals (JS)			