

Salut SEXUAL

SERVEI DE PROMOCIÓ DE SALUT SEXUAL

És un espai d'atenció i promoció de la salut sexual i emocional per a tothom.

Un servei que acompanya des del respecte, la confiança i el no judici.

Hi trobaràs un equip proper, amb formació específica i compromès amb la defensa dels drets sexuals i reproductius, que t'atendrà des de qui ets i des d'on ets.

GRATUÏT I CONFIDENCIAL

Què trobaràs al nostre servei?

- Dispensació de preservatius i lubricants.
- Assessorament i acompanyament entorn les sexualitats.
- Prova ràpida del VIH i la sífilis.

ON SOM?



DÍACRÍ TÍQUÈS

antisid
Lleida



Contacta

Carrer Nou, 14 Lleida

973 26 11 11

629 906 324

consulta@antisidalleida.org

www.somdiacritiques.com

@somdiacritiques

INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

ITS

DÍACRÍ TÍQUÈS

antisid
Lleida

Què son les ITS?

Són infeccions que es transmeten principalment a través del contacte sexual, sigui vaginal, anal o oral. Poden ser causades per bacteris, virus, paràsits o fongs, i algunes poden ser asintomàtiques, fet que fa que moltes persones no sàpiguen que estan infectades.

Sífilis

Sintomatologia

- **Eta**pa inicial: Apareixen al cap d'unes 3 setmanes. Úlceres petites, no doloroses (xancres) a la zona d'infecció (normalment a genitals, anus o boca).
- **Eta**pa secundària: Apareix al cap de 4 o 6 setmanes. Eruptions cutànies a plantes dels peus, als palmells de les mans o a altres parts del cos, febre, mal de gola.
- **Eta**pa terciària: Apareix després de les 6 setmanes. Complicacions greus (neurològiques, cardiovasculars).

Detecció

- Frotis vaginal, anal o faringi o mostra d'orina.
- Anàlisi de sang i proves ràpides d'anticossos.

Gonorrea

Sintomatologia

Apareixen entre el 2n i el 7è dia i poden ser:

- **Penis/Vulva:** Secrecions groguenques o verdoses, dolor a l'orinar.
- **Anus:** Dolor, picor, secrecions o sangrat.
- **Boca:** Mal de gola o sensació de dolor.

Detecció

- Frotis vaginal, anal o faringi o mostra d'orina.
- Proves ràpides d'antígens.



+ info.
canalsalut.gencat.cat



+ info.
canalsalut.gencat.cat

Clamídia

Sintomatologia

Apareixen entre 7 i 21 dies i poden ser:

- **Penis/Vulva:** Secrecions anormals (clara o blanquinosa), Sensació de cremor en orinar.
- **Anus:** Dolor rectal, secreció anormal de l'anús i petites hemorràgies rectals.
- **Boca:** Rarament presenta símptomes, però pot causar mal de gola.

Detecció

- Frotis vaginal, anal o faringi o mostra d'orina.
- Proves ràpides d'antígens (a partir de la setmana 6).



+ info.
canalsalut.gencat.cat

Virus del Papil·loma Humà (VPH)

Sintomatologia

- Només en el cas de les berrugues genitals o condilomes, causades per tipus del VPH de baix risc oncogènic, podem observar símptomes.
- Les persones amb una infecció pel VPH no sempre tenen cap símptoma o presenten lesions difícils de veure a simple vista.

Detecció

- Reconeixement mèdic per berrugues.
- Citologia o proves de detecció de lesions precanceroses (especialment en dones, a través de la prova de Papanicolaou o test d'VPH).



+ info.
canalsalut.gencat.cat

**EI PLAER ha d'estar abans,
durant i després**

ITS	CURACIÓ? TRACTAMENT	TRANSMISSIÓ SEXUAL	PRÀCTIQUES SEXUALS de més risc*
SÍFILIS	SÍ. ANTIBIÒTIC	Xancres o pell/mucoses infectades	P/SO/PN/JS
GONORREA	SÍ. ANTIBIÒTIC	Secrecions del penis, vagina anus o gola	P/SO/PN/JS
CLAMIDIES	SÍ. ANTIBIÒTIC	Secrecions del penis, vagina o anus	PN/JS
HEPATITIS C	Sí en infecció aguda VARIABLE en infecció crònica	Sang	P/JS
VPH	Desaparició o latència intermitent Només símptomes	Pell/mucosa infectada i berrugues	P/SO/PN
VIRUS HERPES SIMPLE (VHS)	NO > latent intermitent Només símptomes	Lesions i pell/mucoses infectades. Secrecions de l'anús, penis i vagina	P/SO
Pràctiques sexuals*: sexe oral (SO) petó negre (PN) intercanvi de joguines sexuals (JS)			